

PROCEDIMIENTO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO ARTRORESONANCIA DIRECTA (ARTO-RM) PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

Se le va a realizar una Arthro-RM directa que ha solicitado su médico como prueba diagnóstica necesaria para su proceso en estudio. Se trata de una Resonancia tras la introducción de suero fisiológico y contraste (Gadolinio) en la articulación que se desee estudiar. Nosotros normalmente realizamos este proceso guiado por ecografía.

En primer lugar se localiza con ecografía un punto de entrada a la articulación solicitada por su médico, y con las condiciones de asepsia adecuadas y administración de anestésico local (si es necesario), se accede a la cavidad articular por medio de una aguja, introduciéndose unos 20cc (según articulación) de suero fisiológico y Gadolinio diluido al 3% para luego realizar la resonancia magnética.

La técnica la realiza un médico especialista, que necesita su colaboración y se le informa de los cuidados necesarios al finalizar la prueba que serán, mantener la asepsia local similar a cualquier inyección y vigilancia con reposo relativo de la articulación las próximas 12 horas.

La duración del procedimiento es variable, normalmente de 10 a 15 minutos, dependiendo de la articulación y luego el estudio con resonancia magnética que tendrá una duración aproximada de 30 minutos.

Como en toda inyección, se puede producir un hematoma que normalmente se resuelve de manera espontánea.

Existe un riesgo de reacción alérgica al anestésico o al contraste que se inyecta en la articulación, pero es muy bajo (indique si es alérgico).

Pueden aparecer también muy raramente, otras complicaciones como la infección del punto de inyección o más raramente de la articulación, aunque la asepsia previa a la misma haya sido correcta.

En contadas ocasiones, aunque la punción es ecoguiada, puede que el contraste no se encuentre en el interior de la articulación, poniéndose esto de manifiesto al realizar la Resonancia Magnética. Este dato ira incluido en el informe por si se cree su médico conveniente repetir la exploración.

Es frecuente que usted note ligera distensión de la articulación tras la introducción del contraste. Se pasa en un par de horas y puede realizar su actividad normal, aunque dependiendo de las molestias puede ser recomendable reposo relativo durante las 12 horas siguientes a la prueba como se le ha indicado.

Continúa detrás.....

ALTERNATIVAS

RM sin contraste, que lo más probable ya se haya realizado, aunque por lo general es menos completa que la Arthro-RM según patología..

Arthro-RM indirecta, implica la administración de contraste intravenoso y la distensión de la articulación es menor, siendo más efectivo el procedimiento directo.

Si necesita más información o alguna aclaración, no dude en preguntar antes de empezar la prueba.

CONSENTIMIENTO

DATOS DEL PACIENTE:

D/Dña:

Con D.N.I. nº:

Declaro que he sido informado/a de forma comprensible y clara sobre las características de la prueba y los riesgos que su realización conlleva, así como que estoy satisfecho/a con la información recibida y que la he comprendido.

Decido (SI // NO) dar mi consentimiento para que se efectúe la prueba por los profesionales adecuados que se precisen, y soy responsable de las consecuencias de mi decisión.

Málaga a.....de.....de 20.....

Firma del paciente

SI EL PACIENTE ES MENOR O INCAPACITADO, DATOS DEL RESPONSABLE LEGAL:

D/Dña:DNI nº.....

Decido **revocar** mi consentimiento..... Firmado.....

Observaciones_____

Revisado por